

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部
普濟方卷三百十

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣金光悌

謄錄監生臣黃廷璧

欽定四庫全書卷

普濟方卷三百十

明 周王朱橚 撰

折傷門

續筋 附論

被傷絕筋論曰凡肢體為物所傷致筋斷絕不相續須
養之

方

補骨脂
肭臍散

出聖
應方

治筋傷骨損

膈肭臍

酒炙

熟乾地黄

焙

芸薹子

研

桑根白

皮剉

沒藥

研

當歸

剉炒各一兩

桂

去麋皮半兩

右為散每服二錢溫酒下不拘時

桂附散

出聖惠方

治骨折筋斷傷損

桂

去粗皮

附子

炮裂去皮臍

白殭

微炙

蒲黃

根剉

古銅

醋淬剉末

當歸

剉炒各一兩

右為散不拘時候以溫酒調下二錢

益母草煎

出聖惠方

治被傷折筋

益母草汁二升

生地黄汁半升

白蜜二兩生用

右和勻以綿絹濾去滓入銀石器中慢火煎不住手攪候如稀餚以磁合盛每服一匙用溫酒化下不拘時

蟹髓方

出十便良方

治被傷筋絕

以蟹髓取甲中并足中者不拘多少畧熬內筋斷處帛繫縛即更擣葛根汁飲之一方生擣蟹炒審良治救急續斷筋法

以旋覆草根洗淨土搗量瘡大小傳之日一二易以瘡為度

治被傷筋絕

出聖濟總錄

用葛根汁飲之葛白屑熬令黃傳瘡止血

小香膠散

出鮑氏方

治斷筋

用白膠香末傳之

治躄折續筋骨

出本草

以牡鼠搗傳之三日一易

治療筋骨斷碎疼痛瘀血

出草部

用粟子生嚼塗瘡上

治續筋骨長肉止痛

出草部

以柳葉煎膏塗之

治被破筋斷者

以旋覆花根搗汁漉瘡中仍用滓封瘡上十日五易
即斷筋便續此方出蘇景仲家獠奴用旋覆花上等
田野人呼為金錢花葉如柳莖細六月開花如小錢

大又有近水生似紅藍

治折傷續筋骨除風癢

用接骨木煎湯浴之

接骨木高三丈許花葉都似陸英水芹輩故一名蒟藳其木輕

虛無心研枝上便生人家亦用之

治傷折跌筋骨生肌破血止痛

用折傷木

味甘鹹平

以酒水濃煎汁飲之

折傷木生資州資山谷藤生統

木生葉似茵草葉有尖圓八月九月採

傷損止痛生肌

附論

凡肢節為物所傷皮肉破裂久而疼痛不止肌肉不生者以寒冷搏之榮衛不溫津液不養故也

方

黃耆散

出聖惠方

治傷折氣血凝滯瘡口不合肌肉不生

黃耆

剉

赤芍藥

熟乾地黄

切焙

當歸

切焙

桂

去粗皮各一兩

乾薑

一分

木通

剉

續斷

剉各半兩

附

子

一枚去臍炮裂

右為散每服二錢溫酒調下不拘時服

黃耆膏

出聖濟
總錄

治一切損傷止痛生肌

黃耆

剉

當歸

焙切

附子

炮裂去
皮臍

白芷

芎藭

續斷

細辛

去苗
葉

薤白

細切各
一兩

豬脂

切一
觔

右除豬脂外搗碎以酒半升拌一宿焙乾次日先煎
脂沸下諸藥候色變去滓以盒盛之不拘多少塗所

傷處

尋痛丸

出危
氏方

止痛清心行氣和血如神

草烏

去皮尖
生用

乳香

火
熨

沒藥

火
熨

五靈脂

各三
兩

生麝香

少許

右為末酒糊丸如指頭大硃砂五錢研為衣每服一圓薄荷生薑研汁磨化止痛

黑神散

出聖惠方

乾瘡止痛生肌長肉

亂髮

二團如雞子大燒烟盡

露蜂房

三分燒煙盡

膩粉

一分

突厥白

三分為末

臘月豬脂

兩

右研細用豬脂和勻以柳木篦子塗於瘡上

長肉散

出聖惠方

治從高墜損有瘡口止痛乾瘡

黃連去鬚

檳榔

木香

蜜陀僧

細研各一兩

麒麟

竭半兩

右為末於瘡口撲之

紫檀香傳方

出聖惠方

治傷折肉破瘡口不合止痛生肌

紫檀香

剉

山芋

鉛丹

研各二兩

馬齒莧

十兩細切暴乾

右除鉛丹外為末再和研勻每用隨瘡大小傳之一

方有紫藤香

檳榔散

出聖惠方

治傷損瘡口不合止痛生肌

檳榔

生對

黃連

去鬚

木香

各一兩

龍骨

煨過半兩一方無

右為散隨瘡大小敷之

麒麟竭

出聖惠方

治傷損皮破成瘡肌肉不生疼痛

麒麟竭

一兩

生人牙齒

火煨過

蜜陀僧

煨過半兩

右為細散隨瘡口大小傅之

止血散

出聖惠方

乾瘡止痛生肌長肉及金瘡

麒麟竭

三兩為末炒令紫色

雞子

十枚取白和風化石灰為三團入炭火內燒令

紅色取出於地上出火毒一宿

風化石灰

十兩研細用小便浸三日三夜後濾出曬

乾為末

右為極細末旋旋糝於瘡上

又方

出聖惠方

石灰三兩鹽

銅青各一兩半

右搗細入砂餅內以泥固濟瓶四畔候乾以十觔炭火煨半日取出埋地內三日出火毒後為末敷瘡上生肌肉乾瘡口

療墮損骨肉苦痛不可忍

以故馬羶兩段其羶須故臍者於鐺中以酒五六觔
著一抄鹽煮令熱即納羶於當中看羶熱使用裹所
損處冷即易之勿令久熱傷肉如是三五遍痛定即
止仍服止痛藥即漸瘥

止血生肌方

用菰菜搗汁人及禽獸有傷折敷之良立愈

打撲傷損

附論

凡打撲損傷或為他物所擊或乘高墜下致傷手足腰

背等處輕者氣血凝滯隨處疼痛重則聚為焮腫痛甚不可忍當察其內外輕重以治之折傷者謂其有所傷於身體者也或為刀斧所刃或墜墮地打撲身體皆能使出血不止又恐瘀血停積于臟腑結而不散去之不安恐有入破攻心之患治療之法須外用敷貼之藥散其血止其痛內則用花藥石散之類化利其血然後徐徐調理生肌或因折傷而停鬱其氣又當順之

方

紫金皮丸

紫金皮

醋炒

劉寄奴

川當歸

煨鹽水炒

香白芷

醋炒

加減

赤芍藥

白芍藥

米泔炒加減

黑牽牛

生地

黃鹽

煨浸炒

川芎

米水浸

川牛膝

茶炒水

乳香

可加減

沒藥

可加減

破故紙

錯炒

木通

去節

木香

茶炒水

自然銅

骨不碎折不用臨好時用

藿香

木賊

官桂

可加

減

羌活

獨活

半夏

五錢水炒無痰不用

骨碎補

草烏

醋炒孕婦不用

川烏

火煨孕婦則不用各一兩

金刃傷剝出臼者去自然銅骨碎補折者用之然須
於此方內且去自然銅臨欲好時却入用之服成他
疾右先擇出自然銅官桂沒藥乳香不炒者其餘藥
或炒或火焙或日晒乾皆可然後入不炒四味同研
為末用蜜糊丸如彈子大以黃丹為衣或被顛撲損
傷金刃箭鏃不問輕重每服一丸如被金刃傷斷損
內重者以薄荷湯或木瓜薑燈心諸湯吞下若顛碎
用自然銅其他傷不用用之恐生他疾如骨折損賴

痛不止加乳香沒藥白芷川芎各五錢生薑酒下或
不作丸為末亦可或加土當歸熟地黃鹽水炒杜牛
膝茶水炒川芎米水浸炒一方若筋斷加入續斷五
錢

清心藥方

降真香

香白芷

醋炒

蘇木

鹽水炒

枳殼

水浸去瓢

藿香

清油炒

丁皮

鹽水炒

紫金皮

丁香

米泔水炒

木香

茶水炒

木通

去節

山梔子

大黃

沈香

蓮子

煮酒

人參

當歸

濕紙煨

川芎

煨

羌活

獨活

花藥石

醋炮

烏頭

燈心

少許

赤芍藥

各等

分

右為細末或大小腸不通服此亦可用五隔寬中散
同服立效或惡血汚心或煩悶暴死每服二錢薄荷
湯或燈心湯調下或童子小便尤好為散水煎服亦
可如痰血口中出可加半夏

定痛沒藥散 治一切打撲傷損筋骨疼痛

蒼朮

一觔刮去黑皮炒紫色

桂

去粗皮

熟乾地黄

焙乾

沒

藥

甘草

炙微赤剉

蒲黃

各一兩

右為細末每服二錢溫酒一盞調下不拘時候日二服

活血丸

治患者血脈不和筋急行步不可服之寬筋

乾地黄

酒煮二兩

當歸

煨

白芍藥

續斷

麵水炒

白朮

煨

川芎

醋炒各一兩

右為細末麪糊丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒下

石斛丸 治打撲損傷後止疼痛補虛損

石斛

去根

牛膝

去苗

杜仲

去縹皮炙微黃剉

肉從蓉

酒浸

一宿刮去縹皮炙乾

附子

炮裂去皮臍

桂心

木香

牡丹

皮

黃耆

剉

熟乾地黄

各三分

狗脊

去毛

川草

薤白

剉

羌活

人參

去蘆頭

山茱萸

各三分

鹿茸

去毛塗酥炙微黃

防風

去蘆

芎藭

檳榔

一兩半

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫酒送

下日三服

附子散 治閃肭打撲傷損疼痛不可忍

附子

炮裂去
皮臍

敗龜

醋炙去
展欄

虎腦骨

酥炙

栗楔

千金藤

補骨脂

白芷

骨碎補

去毛
炒

自

然銅

煨三遍
醋淬

續斷

赤芍藥

當歸

切各
一兩

牛

膝

酒浸一
宿焙

桂

去
皮

烏藥

各半
兩

沒藥

乳香

各研

分一

右為細末每服二錢蘇枋木酒調日進三五服

紫金皮散

出鮑
氏方

治一切打撲損傷金刃箭鏃浮腫

紫金皮

醋炒

天南星

半夏

黃柏

鹽水炒

草烏

炮

川烏

炮

川芎

川當歸

煨

杜當歸

烏

藥

川白芷

鹽水炒

破故紙

劉寄奴

桑白皮

川牛膝

各等分

右為末生薑薄荷汁魚水調糊腫處皮熱甚加黃柏皮生地黃五錢有瘡口者勿封其口四畔用此糊之

紫金散

出醫方大成

治打撲傷折內損肺肝嘔血不止或

有瘀血停積於內心腹脹悶

降真香

續斷

補骨脂

各一兩

紫金藤皮

二兩

琥珀

別研

蒲黃

牛膝

酒浸一夕

無名異

燒紅酒焯七次

當歸

焙

桃仁

去皮尖炒各一兩

大黃

紙裹煨

朴硝

別研

各一兩半

右為末每服三錢濃煎蘇木當歸酒調下併進三服

利即安

乳香黃芪散

治打撲傷損筋骨及瘡腫焮作疼痛

乳香

五錢別研

沒藥

五錢別研

黃芪

當歸

酒浸

赤芍

藥 川芎 甘草 麻黃 陳皮 各一兩 人參 去蘆

一兩 栗殼 去頂帶蜜 水炒二兩

右㕮咀白水煎病上食後服病下食前服

乳香消毒散 出御藥院方 治一切傷折蹉跌焮腫疼痛不

可忍者

乳香 另研 沒藥 另研 白斂 白芍藥 各一兩 白芥

子 當歸 滑石 二兩 黃蘗 另研細末三兩 黃丹 三錢

如加血竭 另研半兩

右為細末入另研者一處再研勻每用新水調如稠膏攤在紙花上貼患處

接骨膏

出聖惠方

治一切打撲驢傷馬墜脫臼折骨兼定

疼痛

續斷

一兩

桂心

皮去

附子

炮裂去皮臍

白及

白斂

當歸

切焙

桑根白皮

剉

獨活

去蘆頭

黑狗脊

骨

燒作炭用各一兩

黃米

炒三合

右為末或打撲閃肭及骨折碎用藥末三錢酒半盞

白麪二錢生薑自然汁少許同以慢火熬成膏攤帛上貼之三日一換用米沙木篦子綿繩夾縛夏月柳枝子五條夾縛雖緊不妨

又方一字散

選出百一方

治一切打撲傷損筋骨折有人

醉亡酒墜懸崖之下昏不醒手臂已折昇歸得此藥遂愈

五靈脂

另研

沒藥

別研

烏頭

去皮臍生用

草烏

去皮臍生

用各四兩

地龍

乳香

各半兩另研

麝香

半錢別研

朱砂

三分
別研

白膠香

一兩後四味
加減些不用

右為細末每一字溫酒調下為丸如梧桐子大加減
自少至多服之亦可腰以上損食後服腰以下損食
前服覺麻為驗如未加藥麻甚即減昔趙叔恭名公
寅以善錘鐵著名其父宰嵯縣日因與族人聚飲超
化寺醉亡酒墜懸崖之下亟視之昏不醒人事臂已
折昇歸得此藥治之遂愈其後運錘如故叔恭嘗知
太寧監云

大續筋接骨丹 治打撲閃肭筋骨剝者

肉蓯蓉 川山甲 黃丹飛 龍骨 虎骨炙

白及 木鼈子仁 天靈蓋各半兩 寒食麵一兩

右為末醋熬為膏攤絹帛上塗折處綿纏竹篾正一

日一換效

治跌撲傷損

乳香 沒藥 白芍藥 烏頭水浸去皮 當歸酒浸一宿

骨碎補去毛 自然銅火煨醋淬七次各一兩 川芎 生

地黃

各一兩

右為末生薑自然汁和蜜煉熟為丸一兩作四丸酒

半盞蘇木汁半盞化藥服

雙鳥散

出朱氏集驗方

治諸傷百損如被打破傷損之後時

時疼痛雖新被傷後不破皮而肉損者尤宜服之

川烏

草烏

畧炮各三錢

白芍藥

蘇木

生乾地

黃大黃

紅麴

當歸

半兩

麝香

少許

右為末用酒煮一瓦瓶放冷服如覺痺麻無害但二

烏頭生用有力恐其太猛所以用溫火畧炮

乳香丸

出聖濟
總錄

治打撲損傷疼痛

乳香

一兩

桂

去粗皮

安息香

沒藥

各半兩

地龍

炒

補骨脂

炒各二兩

當歸

切焙

白脂

五靈脂

二兩

右為末將乳香沒藥安息香三味用酒研如糊和餘藥丸如龍眼大每服一九酒磨溫服不拘時

續骨丸

臘月豬脂

十兩

蠟

煉過半斤

鉛丹

重羅

自然銅

煅醋淬七次研

細

蜜陀僧

研細各一兩

白礬

十二兩

麒麟竭

沒

藥乳香丹砂各一兩

右新鼎中先鎔脂次下蠟出鼎放冷處入蜜陀僧鉛丹自然銅緩火再煎滴入水中不散更出鼎放冷處下諸藥用柳篦攪勻瀉水入磁盆內不住手攪至凝丸如彈子大且用筭皮之類襯之冷收凡折傷用一丸入少油火上化開塗傷處以油單護之甚者以燈心裹木夾之更取正已骨折者兩上便安牙疼甚者

貼之即止

沒藥降聖丹

出醫方大成

治打撲閃肭筋斷骨折攣急疼

痛不能屈伸及榮衛虛弱外受遊風內傷經絡筋骨

緩縱皮肉刺痛肩背拘急身體倦怠四肢少力並皆

治之

自然銅

火煨醋淬十二次
研細水飛過焙

川烏頭

生去皮臍

骨碎

補毛

白芍藥

沒藥

研

乳香

別研

當歸

焙炒一兩

生乾地黃

川芎

各一兩半

右並生用為末以生薑自然汁與蜜等分煉熟和
丸每一兩作四丸每服一九搥碎水酒各半盞入蘇
木少許同煎至八分去蘇木熱服一九空心食前

定痛丸

出宣明論

治打撲傷損筋骨疼痛如骨損者先用

竹夾正骨定後用好酒下麻黃三錢然後服此藥大
効

乳香分

葫蘆根

白皮乾

川椒

當歸

沒藥

赤芍藥

川芎

自然銅

以上各半兩

右為末鎔蠟為丸如彈子大細嚼酒下一丸骨碎者
先用竹夾夾定三五日依舊小可與服

乳香定痛散

出醫方大成

治打撲傷損落馬墜車一切疼

痛

乳香 沒藥 川芎 白芷 芍藥 甘草 牡

丹皮 生地黃

右為細末每服二錢酒并童子小便調下不拘時候

如聖散

出百一選方

治打撲傷損筋斷骨折接骨定痛

良薑 吳茱萸 金毛狗脊去皮 木鼈子去殼 白

膠香

別研

敗龜

醋蘸炙黃

牛膝

當歸

各半兩

右為細末入麪同藥末酒熬成膏子敷貼用紙七重封繫定筋骨自然相連七日一換酒麪皆不可多用以麪熟為度熬過恐乏力

沒藥四生丸 治打撲閃肭損傷筋骨疼痛及寒熱濕

骨痛

防風

當歸

焙

川烏

炮去皮臍

草薺

細切

自然銅

醋淬
七次

骨碎補

去毛各半兩

乳香

沒藥

各一分

右為細末醋糊為丸如小豆大每服二十九溫酒下

食前日進二服

延胡索散

出聖濟總錄

治打撲傷損疼痛筋骨未合肌肉

未生

延胡索

桂

去粗皮

沒藥

別研

乳香

各一分

當歸

焙切

白斂

桑上寄生

生

熟乾地黄

各一兩

黃

耆

剉一兩

右為散每服三錢溫酒調下不拘時候煎服亦可

乳香散

出聖濟總錄

治傷損血入口四肢疼痛不可忍

乳香

研

白芷

桂

去粗皮

沒藥

研

安息香

研

地龍

去土炒

補骨脂

炒

當歸

炙半兩

右為散熱酒調下二錢

封裏虎骨膏

治傷折

虎骨連項鑠一穿

鯪魚甲連項鑠骨一穿 敗

龜背骨

一枚以上五味燒成灰研為極細淨末

日炙沙

二兩雨後地卷皮是

也淨者
火煨

花乳石
二兩煨
令化

狗頭骨
一枝

雄雀糞

尖者炒
一兩

右為細末每用一大匙醋煮粟米入藥乘熱攪勻攤
在帛子上裹痛處如是痛定一日一度洗換新藥

接骨桂芸膏 治打撲筋骨傷折疼痛不可忍

桂
去粗皮

芸臺子
研

白芥子
研

木鼈子
去殼研

大黃
剉

敗龜甲
酥塗炙

赤狗腦骨
燒灰各一兩

右為末每用小黃米粥於布上攤勻摻藥一匙頭在

上於損處裹之以竹片夾定用繩子縛一復時解去
換藥

沒藥乳香散

出醫方大成

治打撲傷損疼痛不可忍

白朮

剉微炒
五兩

當歸

焙切

甘草

剉炒

沒藥

別研

白

芷

各二
斤

桂

去粗
皮

乳香

別研各
一兩

右為細末入研藥再研令勻每服二錢溫酒一盞調
下不拘時候日進二三服

乳香丸

治打撲傷損或從高墜下跌撲傷損及臂虛

寒濕搏於骨節之間疼痛不可忍者並皆治之

乳香

蒼朮

五兩去黑皮炒

天仙子

炒黑

澤烏頭

三兩生去

皮

自然銅

醋淬七次

黑牽牛

微炒

官桂

去粗皮以三四味三

兩二錢半

右為細末水麪糊為丸如梧桐子每服十丸至十五丸食前空心溫酒送下

五傷接骨丸

一名沒藥散

治打撲內損筋骨疼痛及治一

切傷折驢馬傷墜

沒藥 乳香 芍藥 川椒去子及開口者 川芎 當

歸

各半兩

自然銅

二錢半炭火燒

右為末用黃蠟二兩鎔開入藥末不住手攪勻如法
丸彈子大每服一丸用好酒煎開乘熱服之隨痛處
卧霎時連進有効

治打撲傷損骨頭方

乳香

沒藥

各三錢

木綿灰

一錢

黃蘗

一錢

童子

頭髮

燒成灰

水蛭

炒各一兩

右為細末每服三錢溫酒調服骨頭碎者再服

續斷丸 治撲打筋骨疼痛

續斷

二兩

防風

去

黃耆

剉

各一兩

乳香

研

沒藥

研各半兩

自然銅

煅醋淬七次一兩

牛膝

酒浸切焙一兩五錢

右為末酒煮麴糊丸如梧桐子大每服三十九丸用溫酒送下不拘時候服

甘松丸 治撲打損傷手足筋骨疼痛

甘松

去土淨

黃荊實

芥菜子

陳者

赤蓼花 白

殭蠶

炒

欖子

螟蛉殼

各半
兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九溫酒化下不拘時候

治被打繫頭眼青腫方

以肥豬肉炙令熟撮上或炙豬肝亦可

乳香沒藥散 治打撲傷搥損

乳香 沒藥 當歸 縮砂仁 枳殼

用米炒

甘

草

各等分

每用白水盞半煎三四沸用溫無灰酒三兩點便服
在上食後服在下空心服

治打撲傷損

苦丁香

十個甜瓜蒂是

草烏

錢五

沒藥

錢三

自然銅

錢半

青皮

錢二

右為末每服二錢用溫無灰酒調下服後除黑牛肉
蘿蔔二味以鹽食外其一應肉物並忌効

神効膏 治打撲傷損筋動骨折不問手足腰背並皆

治之

糯米粉合一

飛羅麪合一

馬屁勃

一
碗即
灰蒜

右三味拌勻和於生布上篩用生薑自然汁半碗調
却入後項藥

牛膠

二
兩

酸米醋

一
碗

右先用醋熬牛皮膠化便入前所調三味藥不住手
攪成膏子以磁器盛之每遇磕損以藥膏攤於紙上
貼被傷處却用杉木片夾定用厚衣服裹之勿令動

三兩日一換若初折者只三次効

加味芎藭湯 治打撲傷損敗血流入胃腕嘔黑血如

豆汁

方見本門傷墮致損吐唾出血類

治打傷折損一切疼痛及血氣攪刺內傷血聚以麒麟竭為末酒調服之

又敷藥方

紫金皮 蒼朮 豬牙皂角

切焙三兩

鷄角楓葉

骨碎補

各等分

右為末糊水調糊腫處

地黃散 治打撲傷損筋骨疼痛

熟乾地黃

焙

當歸

切焙各三兩

羌活

去蘆頭

苦參

各一兩

續斷

四兩

右為散每服三錢溫酒調下不拘時候

海金沙散 治打撲內損疼痛

海金沙

二錢

大黃

生

乳香

研

沒藥

研各二錢

麒麟

麟竭

一分

右為研外羅為散和勻每服二錢乳香溫酒調下不拘時候

牡蠣散 治打撲傷損疼痛

牡蠣

一斤半炭火燒紅細研水飛過取一斤

鉛粉

洛陽者炒黑細研半斤

硼砂

研

乳香

研各一兩半

右研勻先用醋煮小黃米粥攤紙上用藥末三錢勻
摻粥上裹貼患處次用藥末二錢濃煎蘇枋木汁一
盞調下不拘時候

活血散

出三因方

治童子婦人內外損傷止諸疼痛接骨

和血一切傷折毒蟲咬陰氣入腹消諸水腫血脈不通左右癱瘓熱痼等欲死及腹中有瘀血刺兩脅疼氣築心悶亂婦人乳癰產後敗血灌注四肢積痔瘡瘻但是疼痛並宜服之極痛者只一丸輕者只半丸用無灰酒半升乳香一皂子大先磨乳香盡次磨活血丸同放銚子內煎五六沸臨卧時溫服服了就痛處卧如要出汗衣被蓋之即汗出若婦人諸疾服時

更用當歸末一錢依前法用乳香酒煎之此藥神驗
不可言有孕婦人不可服

花桑枝

一兩五錢於五月五日正南採南枝燒煙盡旋投入醃醋中取出焙乾為細末

雄黃豆

一兩淘浸去皮曝乾或入米醋炒焦存性為末

乳香

半兩旋研入

墨

半兩旋研入

生粟屑

一兩半粟包中間一片子號曰粟屑雙者不用去皮取肉

曝乾為末或作粟子四百個連皮燒入米醋浸再燒再入醋內又燒存性

右於五月五日合忌雞犬婦人見先研乳香以醃醋調與四味相和稀稠得所拌和成劑於淨白中搗三

五百杵可丸即丸如小彈子大焙乾以紗葛袋盛入
磁合內封夜間面北極燒香禱祝云若男若女諸疾
服之病悉除愈本法合成輕乾後水上浮為妙應折
已損猶敗血宜服之服畢即服敗血散即雞鳴散方
見本門從高墜下類

又方治打撲傷損

當歸尾 赤芍藥 肉桂 蘇木 生地黃

右各等分酒煎服

神驗膏

出聖
應方

治打撲傷損

頭醋

一

不蛀皂莢

十個去
皮子

芫花

二兩

白礬

一兩

右搗皂莢令熟并芫花同於淨鍋內入醋煎三分去
二以新絹絞去滓洗鍋淨却入汁次入白礬煎如餳
於磁合內貯之凡有損處以布絹上攤令勻貼日一
換之兩三上便瘥

黑狗頭骨散

出聖
應方

治打撲傷損成瘡多時不瘥

黑狗頭骨

炙令
微黃

天靈蓋

酥塗炙
令黃

生牛皮

燒
灰

天南星

炮裂
一兩

右為細末每服以溫酒下二錢日三四服

牛膝散

治打撲折傷筋骨損痛

牛膝

去苗酒浸一宿烘四兩

黃耆

續斷

當歸

切焙各一兩

滴乳香

別研

沒藥

別研

琥珀

各半兩

右為細末用黃米粥微熱攤紙上將藥末兩匙摻在

粥上裹之已減痛更將此藥每服溫酒調下一錢日

三五服不必拘定時候

螵蛸散 治跌破出血

用烏賊魚骨為細末傅之亦治湯火傷爛

烏賊魚骨用不經鹽

者淹

治傷筋動骨打撲傷痛

出百一選方

生硫黃 官桂

各三兩為細末

生薑

約四兩許

麴

右研碎帶濕裹在損處其熱如火外用帛縛定一日

一換晝夜貼六七日即愈硫黃桂能發散薑麴能和

筋脈活血

烏金散

出儒門事親

治打撲傷損

當歸

一兩

烏金石

鐵灰是一兩

大黃

一兩童子小便浸用

自

然銅

金色者研碎醋熬一兩

右為末每服二錢紅花酒半盞童子小便半盞同調

下食前日三服

木鼈子

出聖濟總錄

治打撲損傷瘀血不散疼痛

木鼈子

去殼研半兩

桂

去粗皮三分

芸薹子

酒浸研二合

丁香

五十粒

右將丁香桂為末與研者二味和勻熱裹之一日一易

白斂封藥方

出聖濟總錄

治損傷止血

白斂

白及

白芷

碧蘆皮

炙黃各一兩

右為末雞子清拌石灰炒乾後入前末研細傷損處封之

穿山甲膏裏方

出王氏博濟方

治傷折筋骨

穿山甲

燒灰

虎脰骨

燒灰各一兩

雞舌香

一個生用

右為細末每用一錢看所患大小以黃米粥攤在紙上候溫糝藥末在粥上封裹所傷處疼痛立止隔日換貼之

治傷折大小閃肭心胸不利及二便不通

水馬兒

三箇

琥珀

麝香

寒水石

各一錢

右重煎大黃湯空心下多於道間得之令人心腹疼痛脹氣衝心胸不即治之亦能害人好黃丹方寸匕蜜調服口噤即灌之

接骨丹

出濟生總類

治打撲傷損皮骨者

蘇木

一錢研極細末

定粉

一錢

南礪砂

別研一錢

半兩錢

燒紅醋淬為末一錢

右為末同勻作一服煎當歸酒調三二服痛止勿服

施捨脩方有當歸無半兩錢

至聖黑龍膏

御藥院方

治因損傷筋脈時發疼痛遇寒則

甚

米粉

一觔緊者少用砂鍋內炒勿令熟焦

香白芷

甘松

各半兩

滑石

三兩
六錢

黃蘗

黃丹

右為細末每用滴水調成黑強膏子攤在皺紙條兒上可於內損疼痛處敷貼每日一換

治抹損傷

出醫方
大成

天南星 白芷 半夏 白及 黃蘗皮 赤小

豆

各半
兩

右為細末薑汁傳患處蜜糖亦好

治打撲傷損

出本
草

用生葛根搗爛以陳米醋調開攤在痛處帛縛定

治打撲傷損定痛掩腫

出本
事方

木瓜 蒼朮 蜜陀僧

各等
分

右為末入麴少許調作糊貼痛處

又方

出本
事方

草烏 白殭蠶 蒼朮

各等
分

右為末薑汁調貼痛處

又方

出本
事方

治打撲傷損腫痛

天南星 半夏 地龍

各等分

右為末用薄荷生薑汁調貼痛處

小烏沈湯 治癰撲傷損外貼膏內服此藥

烏藥

二兩

香附子

一兩

乳香

半兩

沈香

三錢

右為細末每服二錢以熱酒調隨病上下服之

茴香酒

出醫方大成

治打撲內損及墜傷肢體凝滯瘀血

腰脅疼痛

破故紙

炒

茴香

炒

辣桂

各等分

右為末每服二錢食前服熱酒調下

白附子散

出聖濟總錄

治打撲內損及墜馬等傷

白附子

炮

續斷

防風

去叉各一兩

右為散每服二錢童子小便和熱酒一盞調併三服

不拘時

摩膏

出聖濟總錄

治打撲內損疼痛

蓖木麻

去皮研一兩半

草烏頭

生為末半兩

乳香

研一錢

右和勻量多少入加煉成猪脂研為膏每取少許塗

傷處灸手摩令熱徹効如痛甚不可摩即塗腫處

治打撲傷損疼痛方

出聖惠方

甜瓜子

橘子仁

各二合

右為細末每服以暖酒調下二錢日三服

神効膏

出御藥院方

治損撲著筋骨疼痛

川椒

二兩炒黃

乳香

八錢另研

右為細末用好醋打麪糊調藥塗在痛處上用紙貼

之

內消散

出鮑氏方

治打撲傷損瘀血腫痛不可忍者及杖瘡

黃藥 朴硝

右等分為細末用新汲水和蜜調稀稠得所掃損處

內消立見効

治打撲內損亦治損骨腫痛不止

出鮑氏方

馬屁勃

新瓦上焙成末一兩

牛皮膠

半兩

右用生薑半觔取汁同膠入銚子內熬成膏入馬屁勃末調用紙裹三重塗之立効一方用米醋同熬膏

傳損處昔紹興牢廳二吏用之得効

治打撲傷損筋骨

出本草

用夜合樹皮四兩炒乾為末入腦麝乳香各一錢每服三大錢溫酒調下不饑不飽時服

地黃膏

出危氏方

治打撲傷損及一切癰腫未破令內消

又臂曰脫出

生地黃

研如泥

木香

細末

右以地黃膏隨腫大小攤貼紙上糝木香一層又再

攤地黃貼腫上不過三五度即愈

血醒散

出經驗良方

治打撲損傷

用生地黃芩根去皮或芩燒亦可杵爛半酒半童便
濾藥汁調小便酒灌之生雞鴨血調同服尤佳

治打撲傷損蹉手白骨以此傳之即不痛遂復舊出醫方大成

猴薑

不以多少

生薑

半之

右搗爛罨損處用帛包乾即易之又方以胡薑研爛

取汁同酒煎服或為末酒調服亦可昔長樂縣一盜因役笞箠身無全膚以此藥傳瘡不數日平復如故

治搥損刀抓破

出百一選方

輕粉

錢一

軟石膏

煨令通紅放地上以去火毒細研半兩

右用清麻油調傳止痛不作痕

黑神散

出百一選方

治打撲傷損筋斷骨折接骨

黃牛脛骨

帶髓者不以前後脚用炭火燒酒盡為度取出用好陳米醋浸於地上盆覆令

冷

定真器

炭火煨紅米醋淬七遍以酥為度

右為細末以牛骨末七分定器末三分拌勻如是撲損用好米醋調麴入藥末如稠糊貼損上以紙三重封貼如骨折於紙上更用竹片封扎綃纏不得動若初撲損先以熱酒調服二錢傷在腰下食前日進二服傷在腰上食後服

治顛撲傷致筋骨損者

出本草

用肥皂不以多少搗細入魚膠煎熬成膏紙攤貼妙
顛損百節疼痛者一夜愈

治打撲傷損皮肉青腫

出衛生家寶方

老黃茄

一個切片焙乾

沒藥

半兩研

右為末每服三錢溫酒調服臨卧時服來日即消

治打傷止痛腫赤色

半夏

南星

各等分

右為末水調敷貼加官桂

硃砂丸

出直指方

治打撲驚汁血入心竅不能語言

以硃砂為細末雄黃豬心生血和丸如麻子大晒乾

每服七九石菖蒲湯棗湯俱可送服

天南星貼方

出聖濟總錄

治打撲損傷瘀血熱疼痛

天南星

一兩

黃蘗

去粗皮半兩

右為末用生薑汁調貼腫疼處

烏頭丸

出聖濟總錄

烏頭

七個去皮生為末

黃狗膽

一枚

右以膽汁和藥末丸棗豆大每以溫酒一盞下三九

酒須飲令盡

奪命丹

一名接骨散出
朱氏集驗方

治打撲傷損微有氣者能治

乳香

沒藥

各一兩

右為末和勻每服三錢溫酒調灌連進三五服少刻
小便利血乃止

又方

用真川椒絲瓜纏小藤兒用鹽一撮水二小椀煎至
一椀呷在口嗽含之吐出立愈

治打撲傷折手足

出醫方
大成

用萊豆粉新鐵銚內炒令紫色用新汲水調稠厚傅損處貼以紙將杉木片縛定立効

又方

出本草

用金櫻子細嚼咽之血止

治打傷刀傷血出不止

出本草

用血竭草炒熟罨傷瘡處

治打撲傷損

出本草

用野柿樹根細杵米醋調開攤痛處

治折傷見血

出百一
選方

用槐花不以多少內一半炒焦色烟出却將先者一半拌勻入沙合子中同罨令冷為末飯飲調下仍用極細者數破處一方用陳槐花入血竭同為末乾糝傳公實之僕忽折足得之於一軍人遂愈

芭蕉膏

出百一
選方

用糯米粥攤布帛上以芭蕉根放粥上乘熱裹患處雖時下甚痛即便無事

又方

出百一選方

治一切墜壓擗撲傷損至重困者

用無名異三五塊研細入溫酒中調藥服訖溫酒半盞投之傷在頭去枕卧餘皆就所傷卧

吳內翰初得此方姪女戶限上損腦痛呼試令服之立止又嘗墜馬失脚損腰至重服十餘塊飲酒二升其病皆愈後以救小人無不効一方用無名異末熱酒服趕下手摩血皆散矣

四妙散

出永類鈴方

治打破跌損內傷

骨碎補剉 生薑 乳香 當歸

右搗酒熱服接骨加自然銅

治打撲搥傷損

出百一選方

用石榴葉細研罌損處一方用榴皮研

又方 治打撲傷損

以鹽梅搥塗瘡口永無破傷風黑神散蜜和生薑自

然汁調敷加官桂尤良

又方 治癰撲傷損

用白芥子為末和童便服之死者復甦

治顛撲腫痛

用米粉炒黃為末放地上出火毒氣用醋調罨之腫

消痛止即愈

滅痕方

出經驗良方

治打撲有傷痕瘀血流注

以半夏為末用水調塗傷處一宿不起痕

又方

出危氏方

治瘀血流注紫黑或傷痕上血紫黑

用大黃為末以薑汁調塗一夜一次上藥一宿黑者

紫二宿紫者即白矣

治打傷瘡

出本
草

用老鼠一箇自死臘月者和腸肚劈剉油半觔煎令焦黑用罐收之使時以雞翎惹油傳於瘡上即乾瘡

治打搥傷損瘀血腰痛骨疼骨冷

出本
草

以生薑研微暖塗貼心痛酒醋服之

治打搥損疼痛

出聖
惠方

用夜合花為末酒調服二錢炒

與合
散同

治腦骨破及骨折

用葱白細研和蜜厚封損處立瘥

治撲損

用胡桃肉合破故紙擣篩蜜丸朝服梧桐子大三十丸療壓撲損傷擣肉和酒溫頓服便瘥用陝洛間者

治打損折去瘀血

出本草

用甜瓜葉為末酒服之或搗敷之

治一切傷損不可者止血生肌無癰痕

出本草

用楊梅核和鹽杵之如泥成挺子竹筒中收過破即填小可即傳之此藥之功神聖絕妙

治墜傷撲損瘀血煩悶

出肘后方

用蒲東末空心熱酒調下三錢服之即瘥

治有中傷因損者腹中瘀血

出本草

用熱酒調狗膽半箇服之瘀血盡下

治一切傷折

出肘后方

用寒食蒸餅不限多少為末酒服之驗

金匱要略卷三百十
治多年傷折不瘥

出肘后方

以炒冬瓜子末溫酒服之

治撲損

取龜血作酒食肉生研厚塗之立効

補骨脂裹方

出聖濟總錄

治打撲傷損

以補骨脂二兩微炒擣為末用醋煮黃米粥攤在紙

上封裹損處

治打損成瘡不合并竹椿戳破手足

以草麻子去殼生研貼患處如乾以津唾潤之

治有病呵欠口不合及卒然牙關緊滴水不能入以致

死者

出經驗良方

用鹽梅二箇擦之牙關即開復又口不合者亦用鹽梅肉擦兩牙榘即合此是風証

閃肭

附論

凡舉動不慎為外物所擊致死腕折者筋骨損血氣蹉跌或留積或瘀燬腫疼痛宜速治之外則傳貼肌肉內

加調養榮衛之劑則肢體可完矣

方

補痛丸 治閃肭筋骨諸痛

川芎 附子 赤小豆

錢各三

乳香 沒藥

錢各三

赤土 蘇木

錢各三

降真香 木鼈 草烏

錢各二

錢

烏藥

錢三

右為細末酒糊丸如梧桐子大每服三四十丸用酒任下取溫暖為度

淹藺子丸

出德生堂

治墜墮閃肭氣滯腰疼之症

淹藺子

半兩

沒藥

二錢另研

杜仲

去粗皮半兩

乳香

三錢

半另研

破故紙

炒半兩酒浸一兩炒

威靈仙

淨洗一兩

八角

茴香

二兩

川練子

二十一箇去核七箇用巴豆仁炒七箇海金砂二錢炒七箇斑

發去毒炒過後用

牽牛

四兩止取頭末每一兩炒取二錢

穿山甲

四升

蛤粉炒

吳茱萸

洗淨再炒四兩

右為細末酒糊丸如梧桐子大每服三十九空心鹽

湯下乾物壓之

治打破血出不止方

出聖濟
總錄

用燈心爛嚼和津唾貼之或用帛裹之血立止

療打破青腫方

出聖
惠方

以水磨桂塗之赤則以牆中朽骨磨塗之立効

又方

出聖
惠方

治墜傷瘀血不散肉色青黑方

取釜臍下土細末塗之一方深掘竈中心好土三升
於鎚以水拌熬熟用青布裹於痛處熨之冷即頻
易

又方

用羊上卧之

治打撲傷損

出海上名方

以炒松枝節磨用無灰酒下一方井華新水磨塗患處或用酒煎亦可服

治搥損久年爛者

出本草

用茯苓草葉如天郎機一般研細用鹽些少盒患處二三伏即可

治打撲傷損

用糟和紅豆末炒熟，卷傷處，杉板夾之。

治皮破

用燒鹽泡湯調，四圍蜜亦可。

治一切打撲跌傷，肢體碎折者。

用梧樹向陽根上，皮剝碎，同酒糟一處，擣爛，銚內炒。若先將損骨，搯上次，用藥乘熱厚敷上，却用杉木厚皮、杉木片亦可夾住，以麻爛編繩纏縛，定勿動，以黃

蠟鎔為丸如桐子大酒送百十粒日二服夜以甜瓜子炒焦色為末酒調服至三五十服不妨

治傷折及胸閃折筋骨傷損

用骨碎補石上生者如無用樹上生者取其根拭其毛後加生薑搗篩以煮黃米粥和傅損處

治打撲傷損及刀斧所傷生血生肌定痛

用好降真香碾為細末臨用看瘡口大小乾糝上便不疼亦可作膿或以好酒須無灰者同煎服尤佳發

背瘡惡瘡等疾洗去膿水亦可乾貼須用結實色深者

治打撲傷損出血不止

用紫蘇研爛盪之瘡口自合一方以葉為末乾糝良

治打撲傷損

用牡蠣火煨數次為末濃煎蘇木酒下四五錢如損上體則食後服損在下則食前服

治被打擊頭面青腫方

用新雄羊肉垂熟封之

又方

以葭苈子為末傅瘡上一方用大豆黃末水調塗之
治打撲傷損

以柑橘葉白酒糟杵細縛痛處或燒地令紅用醋并
潑地上急鋪薦令患人卧蒸出汗內則服藥外則貼
掩則易安

治跌撲內損昏悶不醒者

用生料木香調氣散一貼再加羌活獨活蓬朮用水一盞半童子小便一盞同煎連進三服立効

治打撲傷損

以葱新折者便入爐火中煨乘熱剥擘開其開有涕便將竇損處仍多煨取續上易熱者崔給事云頃在澤潞與李抱真并判官李相方以毬杖毬子其軍將以杖相格便乘勢不能止因傷李相拇指并爪甲擘裂遽索金瘡藥裹之強坐頻索酒飲至數盃已過量

而面色頰赤斯須云已不痛凡十數度用熟蔥并涕
纏裹其指遂畢笑語

金絲膏 治打撲傷止痛散血

右將松脂嫩者四兩先鎔二兩傾入水中候冷取出
將已入水者再鎔成汁謂之兩熟却以二兩生者一
處鎔成汁入麻油半兩冬月多些用油紙攤隨所用
大小貼之

治傷損成瘡中風亦治傷損成弓風

以蜀椒麴裹作餽飩灰中炮之使熱斷開口封其瘡
上冷易熱者三五度易之

治諸傷損血氣併心不省

白芷

一兩

大黃

木通

各半兩

山梔

十箇

百草霜

二錢

右為細末每服二錢蘇木湯下血作潮熱大艾煎湯

醋調

治諸傷使不通

豬苓

滑石

車前子

各半兩

天花粉

三錢

海金

沙
三錢

右為細末麥門冬煎湯大小便俱不通生大黃末三錢當歸尾二錢紅花二錢熟枳殼半兩煎熟大黃末入加童便酒煎有潮熱除酒用水

治傷紫痕

紫金皮小便浸七曬作末痕青腫黑紫色用地黃生薑汁調不腫用蔥汁閃腰痛神麴火煨紅酒淬溫服

或米醋和平胃散釐痛處或杜仲制及時蘿末酒調
治打撲損筋骨折傷

用胡量草搗篩與松脂乳香花桑柴炭亂髮灰同熬
如彈子大如有其病以熱酒磨一丸服之其疼痛立
止

鬼代丹

出經驗良方

治打不痛

乳香

沒藥

無名異

自然銅

火煨醋淬

木鼈子

去皮

地龍

各等分

右為細末蜜丸彈子大酒送一九遇打著體不痛

治癰撲傷損至折筋骨出者須揣骨歸元位

出經驗良方

五銖錢

十箇大煨醋淬

乳香

沒藥

各半兩

右為細末每服一錢入麝香少許空心溫酒調下以食壓之

治一切損刺傷諸虫咬諸瘡口染著風水毒忽癰腫疼

痛忽如有一條紅線隨脈上出入臟腑宜用此方

活

命方

皂角子

半兩瓶內煨過

麝香一分

右為細末先煮甘草柳枝水淋洗拭乾著藥在瘡口

中用舊罩翠紙裹定便効

治一切打撲折傷腹中碎痛血氣昏悶大腸秘熱數日

不出後宜服此方

出護命方

桂心 木香 當歸 檳榔 芍藥 連翹 荆

芥穗

各一分

牡丹皮

去心半兩

牽牛

大黃

醋炙香熟各一分

兩

右細杵羅為末每服二錢半食後葱湯調下

返魂神白散

出王氏博濟方

治打撲及傷

花乳石

五斤搥碎如皂子大

硫黃

六兩搥碎如皂子大

右用磁合十一箇先入乳石次入硫黃一重重鋪盡

浮上用鴨舌草

獨掃是也

赤石脂和塗合子口縫又用鹽

泥固濟勿令有小縫紋用新磚一塊四面書金木水

火字中央書土字上放合子用炭火二秤燒之耗及

三分漸漸去之取出合子地坑內埋一宿細研為末

但是刀及傷損至死者於傷處摻藥其血為黃水更
摻藥其人復活更不痛不疼如婦人產後血暈至死
但心頭煖即以童子小便調下一錢取下惡血如豬
肝片終身不患血風氣若膈上有血化為黃水吐出
及隨小便出立便効若牛角抵人腸出者急內入以
桑白皮縫合肚皮於縫上摻藥可活亦不得封裹如
損血入臟腑熱煎童子小便及入酒少許用一錢服
之此藥真神仙所傳如逢仁德者傳之

神仙餅子

出宣明論

治一切打撲傷損金石刀刃血出不

止者立効此藥敷上無膿退痂便愈

烏魚骨

一兩五月五日
前先進脩下

青蘗草

一握一虎口人
手取團圓是也

萵苣菜

一握

韭菜

一握

石灰

四兩

右以五月五日未出本人不語將取三味同杵爛次
後下餘藥味杵得所搏作餅子晒乾用時旋刮用敷
之

正骨散

出楊氏
家藏方

治打撲傷折筋攣骨損

蘇木

四兩
細剉

當歸

四兩
洗焙

無名異

一兩

白蒿
莖菜

二兩

沒藥

半兩
別研

乳香

半兩
別研

右件咬咀每服三錢水一盞煎至半盞去滓再入酒半盞和勻溫服不拘時候

大活血丹

出衛生
寶鑑方

治打撲折損筋骨俱損痛楚呻吟

瘀血不散內或疰氣轉側不得或下惡血皮膚青腫破損傷風手足腰膝不能舉及牛觸人傷刀斧所損惡血凝結疼痛不止又治癰疽發背腦癰一切惡毒

瘡癰每服一圓濃煎蘇木酒磨下忌一切動風物一
七日婦人溫酒磨下孕婦不可服

當歸

三兩研
為末

陳橐子

一兩半

無名異

一兩
別研

麻

黃

一兩去
根節

香墨

一兩

生地黄

三兩研
為末

芥菜子

一兩

附子香

二兩

芍藥

二兩

乳香

半兩
別研

右用生薑一斤取自然汁熬當歸地黃末成膏入衆

藥末拌勻圓如大彈子大陰乾至妙至妙

中興活血方

出衛生
家寶方

治打撲傷損等疾神効

沒藥

一兩不焙別研

乳香

一兩不焙別研

麻黃

四兩切細炒黃色

五月蠶沙

二兩炒

菱角

燒成灰二兩

川歸

二兩切焙

五

月桑條

燒灰秤二兩用五月五日收

土當歸

二兩切焙

右為末用生地薑各二兩研細入酒醋共一升去滓

煮膏丸前藥如彈子大每服一丸生地黃十寸生薑

三片先研細入酒一盞去滓入藥再研細入酒半升

同煎三五沸溫服便睡須忌生冷油麪無鱗魚等物

及牛馬驢肉六十日如牛馬等撲傷以半丸灌之亦

效

補骨丹

出衛生家寶方

治打撲傷損腰痛

山躑躅

三兩

何首烏

三兩酒浸

黃絲瓜

五兩燒灰

雲母

石

二兩研細入藥

自然銅

二兩煨醋淬取胞為度

右焙碾為末糯米糊為丸如梧桐子大每服三十丸至五十九當歸乳香末酒調送下

當歸散

治跌撲傷損

川芎

當歸

各二兩

沒藥

一兩別研

乳香

一兩別研

蘇

木

一兩

右各剉為粗末酒二升水一升同煎至升半旋飲盡
為度後食臨卧服服訖再依方煎常服如腫消血散
即不用蘇木極佳

六珍湯 治跌損生血氣常服至愈

川當歸 熟地黄 川芎 白芍藥 乳香

別研

沒藥

別研

右各等分為細末每服二錢以酒調服不拘時候神

效

傷損方

自然銅

累累然相綴如亂絲者最佳一兩

右研細水飛過同當歸沒藥各半錢和勻每服三錢酒頻服仍以手摩痛處衍義云有人養折翅鴈飼以自然銅遂飛去

透骨丸 治打撲傷損閃肭筋骨手足無力四肢沈重

乳香

研別

沒藥

研別

川烏頭

生去皮臍

破故紙

瓦上炒重

晚蠶沙 川芎 荊芥穗 海桐皮 自然銅

火煨醋淬上
丸味各一兩

草烏頭生去皮
臍三兩

赤小豆一兩
半

右件為末酒醋麪糊為丸如梧桐子大每服一十九
至二十九煎蘇木當歸酒下食後服

治療打跌血滯腰脅疼

破故紙 茴香各炒 辣桂

等分為末熱酒調下

五神丸 治打撲傷損整骨續筋生肌止痛

自然銅

半兩火煨醋淬研細

川椒

去目二錢半炒出汗

當歸

半兩洗炒

沒藥

別研

乳香

別研二味各一錢

右為細末取青蒿自然汁和丸如菜豆大每服五十

丸熱酒調下

當歸散 治打撲傷損

當歸

沒藥

各一兩

芍藥

木香

川白芷

川

烏

各半兩

川芎

生地黃

各三錢

鬱金

二錢

右為末空心酒調每服二錢如未愈加川牛膝紅花

蘇木各半兩調服

又方

以晚蠶沙生用細末糝勻綿裹之隨手瘡愈血止

治傷損打撲傷筋骨

以胡孫薑即骨碎補石上生者補損樟樹上生者通氣治風損各用一半研爛取汁以酒煎或調服留渣敷傷處制法去皮毛切片微炒常用煮酒內損七日後飲之

治打撲傷損後三五日水食不入口者

用生豬肉二大錢口中嚼爛或用刀打爛却以溫水洗去血水又再搗爛用陰陽湯打和却用半錢多入枕中以雞羽送入喉內閉口者以陰陽湯灌下之其食虫聞此香味竇開瘀血尋上貪食胸中自然開解却用通藥此損血凝聚心間其虫食血飽病人心隔悶他虫不來探故用此活法

治諸傷損

生獨活

兩

草烏

錢二

南星

兩半

紫荊皮

尖尾

黃橙葉

又名木葛
葉能散血

粉葛

麥菜

生者佳

藍菜

能住

痛

右此五味倍用不拘等分細末如打傷有大紫赤色未破血可加良薑山桂皮自然生薑汁調貼無薑水亦可若紫黑色已退除薑桂薑汁却用後藥煎湯泡洗上用前藥以葱汁茶清調敷溫貼或有痛可用餅酒麯調藥不用薑痛腫即除仍喫藥消之若傷跌蹠

骨仍用桂乘熱貼之藥氣透骨痛止

治打撲傷損或骨折者

糞土邊尋小黃蝦蟆如指頭大者七枚放沙鉢內研細入生薑自然汁再研如泥用酒調作一服下屢用有效趙怡夫官常德曾用此療二折足者月餘能行治癰撲傷損歌

半兩青銅火裏飛却將醋淬最為奇更添乳沒并香麝能接殘生斷續肢

右五銖錢大者十文諸藥各一兩小者十文諸藥各半兩研細每服一字空心溫酒調下以食壓之妻姪方恂所傳大有奇效

蘇木酒

出聖濟總錄

治被打傷損因瘡中風

用蘇木推令爛研二兩酒二升煎取一升分三服空心午時夜卧一服

蠶子酒

出聖濟總錄

治被打傷損因瘡中風

用蠶子不拘多少將刀子於紙上量事刮取約一錢

匕細研煖酒三合至五合調服如行里許更一服
熟大黃湯 治打撲腰痛惡血蓄瘀痛不可忍

大黃

生薑

同炒如豆
大各半兩

右同炒令焦黃以水一大盞浸一宿五更去滓頓服
天明所下如鷄肝即惡物也

活血丹

出永類
鈴方

治打撲傷折骨碎筋疼瘀血腫痛煩

悶風痰癰癰頑痺婦人血風產後敗血浮腫血氣痞
痛勞發四肢痠疼孕婦勿服

青桑灰

一斤好醋殺火
大栗間焙乾

骨碎補制

南星生薑汁浸

一宿

赤白芍藥

牛膝洗

川烏炮

雄烏

豆

各一兩
六錢

自然銅

醋淬

木鼈子肉

切和麴炒
赤各八錢

淨細辛

一兩
焙

沒藥

四錢

乳香

六錢並
別研

白膠香

三錢

血竭

六錢或耆
降節代

右為末糯米粉醋煮九杵千下集手丸緩則發裂大

丸重六錢濕中丸三錢濕後乾以漆擦手上將兩三

丸柳漆為衣收用每服半丸無灰酒磨化漸煎三五

沸溫服無時以紗葛袋收掛淨處經久不壞

治傷損皮肉破及刃傷

急用未經水葱白細切炒極熱裹傷處血止痛定或用晚蠶蛾為末和石灰罨傷處住痛止血合口

通靈黃膏

出楊氏家藏方

治打撲傷損驢傷馬墜癰疽瘰癧

鬼箭骨疽漏瘡軟痂眉發背脚膝生瘡遠年惡瘡腫瘡纏喉風五般痔漏耳鼻內生瘡牙疼等疾須是臘前七日浸藥於臘日修合

木香

當歸

焙洗

金毛狗脊

去毛

防風

白及

白斂

香白芷

白朮

乳香

別研

松脂

別研

楓

香

別研

杏仁

去皮尖及雙仁者別研各一兩

右件除乳香楓香松脂外各焙乾細剉用清油三斤

煉熟放冷浸藥於銀石器內文武火養三日勿令大

沸恐損藥力常似魚眼候香白芷黃為度濾過別入

淨鍋內入黃臘八兩細羅黃丹二兩次入已研者楓

香乳香用槐柳枝子不住手攪再上慢火熬少時候

凝成每先用膏藥半分蛤粉為衣溫酒送下次用藥
摩病處如損者以竹夾夾直用藥摩之患纏喉風服
藥不下者先用藥於喉外摩之候喉寬然後服之牙
疼齒浮出血者以藥填齒縫如有清水吐之耳內停
風氣疼痛作聲紙撚住藥在耳內

續骨膏

出朱氏
集驗方

治打撲傷損骨折

黃蘗 半夏 桂花

右為末生薑自然汁調塗腫痛處其功全在生薑如

藥乾頻上薑汁為佳

治諸損九子藥健筋骨生氣血養百脈疎風順氣升降

陰陽虛弱常宜

川牛膝 宣木瓜 天麻 蕤蓉 當歸 川續

斷酒浸

何首烏酒蒸

杜烏藥 白芷 五加皮

酒浸 狗脊製

淮烏薑蔥炒

骨碎補去毛酒浸炒

川

獨活一兩淨

大川烏 附子各一兩焙

乳香 嫩苴

酥炙

沒藥別研

自然銅醋淬

川芎各一兩

兔絲

子

淘淨
酒蒸

杜仲

薑汁
炒

蒼朮

半生半熟上
二味各四兩

全蝎

半兩
炒

破故紙

三兩酒
浸用

虎骨

酥
炙

北五味子

威靈仙

水洗
酒浸

京芍藥

川山甲

蚌粉

炒
細

辛

龜板

酥炙各
一兩半

右為細末酒糊丸常服即補下元藥破傷水方糯米
生用三之二甘草末用三之一沙糖調搽腫處先自
腫赤盡搽敷至瘡口水皆從瘡口出即安

治諸傷至重但不透膜者

出永類
鈴方

以海味中鹹白蛭揀大片色白而有絲紅色者成片
鋪在傷處以綿扎之血即止如膏脂出不傷內膜者
即去患人頭心髮不令患人知以熱熨汁於頂上熨
膏脂自入以桑白皮線縫合用給草木蠟葉礮石為
末乾糝之即合

應痛乳香丸

出永類
鈴方

治諸損

乳香

沒藥

信朱

別研
半兩

白膠香

一兩同
乳香鎔

草

烏

製四
兩

石楠藤

二
兩

骨碎補

炒去
毛

桔梗

白

芍藥

各二兩

熟乾地黃

一兩

川烏

二錢

暗松節

燒過

存性
一兩

荊芥穗

一兩

右為細末醋糊丸如梧桐子大每服三十丸煨葱或

松節酒下

治傷折損等疾方

出朱氏
集驗方

自然銅

醋淬

木鼈

去油

草烏

川烏

治打撲腕折

用菴藺

味苦
微溫

煮汁服之甚效

治打撲并搥著疼不可忍

無名異一味為末用二錢溫酒調下極妙一說辨無名異用磨盞口注水彌滿不溢出效

治一切打撲并杖癰疼痛

右用敗龜為末打糯米糊貼之

治磕撲損骨節疼痛不可忍

右用大鯽魚一尾去腸肚煨熟入生薑一小塊同卷損處有殊效

治搥撲傷損肌膚青腫

用茄子

味甘寒

老黃者一枚切作片如指厚新瓦上焙

乾為末欲卧酒服二錢匕一夜消盡無痕跡也



普濟方卷三百十